

# TIAPRIDE

## (Sereprile®, Italprid®)

1. **Che cosa è e a cosa serve:** E' un farmaco che agisce bloccando l'azione di alcune molecole (neurotrasmettitori) presenti nel cervello aiutando in questo modo a controllare i movimenti involontari
2. **Come si usa:** La dose iniziale varia da 50 a 150 mg al giorno con graduali aumenti di dosaggio fino a 500 mg al giorno (5 compresse). Non importa se il farmaco viene assunto con il cibo o no, deve essere ingerito con acqua.
3. **Cosa dire al medico:** Occorre segnalare al medico tutti i farmaci che si stanno assumendo; se si è sofferto in passato di "allergie" a farmaci; se si soffre di problemi cardiaci. (Per le pazienti): segnalare se si è in gravidanza o se si sta allattando.
4. **Possibili disturbi:** La Tiapride può dare affaticamento, sonnolenza, agitazione, capogiri, vertigini, iperprolattinemia, amenorrea (scomparsa del ciclo mestruale), galattorrea (perdita di latte dai capezzoli). Segnalare al medico eventuali altri effetti ritenuti imputabili all'assunzione del farmaco.
5. **E' importante sapere che...** Alcuni farmaci beta-bloccanti, che inducono bradicardia (riduzione della frequenza dei battiti cardiaci), diltiazem, verapamil, clonidina, guanfacina diuretici e lassativi possono aumentare il rischio di effetti collaterali a livello cardiaco: per questo motivo è particolarmente importante che il medico prescrittore della Tiapride sia a conoscenza degli altri farmaci che si stanno assumendo. Occorre prestare attenzione nella guida di veicoli a motore e nell'esecuzione di attività che richiedono concentrazione perché il farmaco, soprattutto all'inizio della terapia, può provocare sedazione Evitare l'assunzione di bevande alcoliche
6. **Conservazione:** mantenere le compresse nella confezione originale e conservarla a temperatura inferiore a 30° C
7. **Provenienza:** Italia